

ANTIFROST®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

- A készítményt finom porlasztású permetként juttassa ki a teljes növényfelületre.
- Az **AntiFrost®**-ot minden alkalmazásnál vízzel kell hígítani.
- Hígítási arány: 500 ml **AntiFrost®** / 100 liter víz (0,5%-os oldat).

A legjobb eredmény elérése érdekében:

- Mindig klórmentes vizet használjon. Ha ez nem lehetséges, várja meg, amíg a klórszint a lehető legalacsonyabb, mielőtt az **AntiFrost®** -ot a permetlé tartályában a vízhez keveri. Ne használjon 7,0 feletti pH-értékű vizet.
- Az alkalmazást végezze el 7 nappal, majd ismét 2 nappal a hideg, fagyos időjárás előtt.
- A terméshozam és a minőség további javítása érdekében alkalmazza virágzáskor, majd folytassa a permetezést 14 naponta.

Minden alkalmazást szélcsendes, nyugodt időjárási körülmények között végezzen.

Ha az alkalmazás után nem esik jelentős mennyiségű eső, az **AntiFrost®** körülbelül 6 óra elteltével fejti ki hatását.

A kijuttatás 10 és 16 óra között javasolt, üvegházi növényeknél 12 °C, szabadföldi növényeknél 9 °C felett. A készítményt a nap legmelegebb időszakában juttassa ki.

SPECIÁLIS HASZNÁLAT

Ha az adott kultúra nem szerepel az 1. vagy a 2. ábrán, az Általános használat szerint járjon el.

kis kultúrák		lombkezelés	2–3 l/ha, 0,5%-ra hígítva (1 l / 200 l víz)	permetezés
cserjék és fák		lombkezelés	4–5 l/ha, 0,5%-ra hígítva (1 l / 200 l víz)	permetezés
minden kultúra		műtrágyázás	2 l / 10 kg műtrágya	vízzel oldható műtrágyával keverve
minden kultúra		talaj nélküli termesztés	5 l / 10 000 l munkoldat	folyamatos tápoldatozás
vetőmagok		permetezés	0,5%-ra hígítva (1 l / 200 l víz)	száraz kendőre helyezve

1. ábra

A koncentrált **AntiFrost®** pH-értéke 1,9 és 2,1 között van, ami savas, ezért nem szabad más vegyszerekkel és peszticidekkel keverni, melyek pH-értéke magasabb, mint 7, mert az **AntiFrost®** teljesen elveszíti hatékonyságát. A permetezés nem ajánlott 3 bar feletti nyomással, mivel a termék élő organizmusokat (thiobacillus) tartalmaz.

Az **AntiFrost®** nem működik, amennyiben a növény már eleve hideg stressznek van kitéve!

A CropAid International Ltd. nem vállal felelősséget a nem megfelelő dózis vagy a felhasználási útmutató be nem tartása miatt bekövetkező károkért.

Email: csepelitrade@gmail.com, cropaid.hungary@gmail.com

+36205713958

Kultúrák	Alkalmazási időszakok					
	ültetés/ vetés előtt	ősszel (a lomb teljes lehullása után)	keléskor	virágzáskor	1 héttel fagy előtt	48 órával fagy előtt
 gabonafélék	✓		✓	✓		
 gyümölcsök		✓	✓	✓	✓	✓
 alma és körte		✓	✓	✓		✓
 bogyós gyümölcsök	✓		✓	✓	✓	✓
 csereesznye, nektarin, kajszi		✓	✓	✓		✓
 citrusfélék, örökzöld fák		✓			✓	✓
 szőlő		✓			✓	✓
 kiwi		✓✓	✓	✓		
 szilva		✓	✓	✓		✓
 zöldségek	✓		✓	✓	✓	✓
 káposztafélék	✓				✓	✓
 sárgarépa, pasztinák	✓		✓			
 hüvelyesek	✓		✓	✓		
 salátafélék			✓			✓
 burgonya	✓		✓		✓	
 paradicsom, uborka, paprika, padlizsán	✓		✓	✓		
 mogyoró		✓✓	✓✓			
 dió				✓		✓
 cukornád	✓		✓		✓	
 vágott virágok				✓	✓	✓
 üvegházi, beltéri és kerti növények		✓			✓	✓
 gyep	✓				✓	✓

2. ábra

A megadott időpontokban kell alkalmazni, minden pipa egy kezelést jelent.

Azoknál a kultúráknál, ahol két pipa szerepel, két kezelés szükséges, 7–14 nap különbséggel.

A legtöbb növénynél 2–3 kezelés ajánlott, kiegészítve egy további kezeléssel 48 órával a hideg és fagy előtt.